

Indexation : SPM

TRESN°

Précautions pré analytiques :

Préparations :

- Ce test n'est pas recommandé aux enfants de moins de 5 ans.
- Le patient doit être au repos, à jeun depuis plus de 6 heures sans manger, sans boire, ni fumer ni mâcher de chewing-gum.
- Si lors de la réalisation du test le patient vomit, un autre test sera réalisé 24 heures après.

Arrêt du traitement :

- Trois classes de médicament à proscrire avant le test :

Traitements	Médicaments	Arrêt avant traitement
Antibiotiques	Sans exception	4 semaines.
Inhibiteurs de la pompe à protons (Anti sécrétoire)	Oméprazole : Mopral®, Omepral®, IPP® Oesdes® ,Prazol®... Esoméprazole : Inexium®, Rabéprazole : Pariet®...	15 jours.
Pansements gastriques	Maalox®, Rennie®, Smecta®, Gaviscon®....	24heures

Renseignements cliniques :

OUI NON

- Cet examen requiert votre présence au laboratoire pendant 40 minutes, il consiste à recueillir l'air expiré à T0 et T30 minutes après ingestion d'urée marquée.

Prenez-vous un antibiotique ?

- Si oui lequel ?

Prenez-vous un anti-sécrétoire ?

- Si oui lequel ?

Prenez-vous un pansement gastrique ?

- Si oui lequel ?

Signes Cliniques :

Traitement : 1^{ère} fois

2^{ème} fois

Renseignements Patient :

Nom :.....
Prénom :.....
CIN :.....
Téléphone :.....

Auteur : Hajoubi Hicham	Vérificateur : JELLOUL Rachid 2019-10-07	Validation : BENTALEB Lamiae 2019-10-07	Approbation : EL KABBAJ Saâd 2019-10-07	Application : 2019-10-07	Page 1 / 1 Édité le : 14 octobre 2019
-----------------------------------	---	--	--	------------------------------------	--